

**Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
Mirogojska 8, Zagreb**

Ambulanta za urogenitalne infekcije

Informacije i naručivanje radnim danom od 9.00 do 11.00 sati na tel. 2826 187

UZIMANJE URINA ZA CITOLOŠKU ANALIZU

- URIN ZA CITOLOŠKU ANALIZU UZIMA SE TRI DANA UZASTOPCE
 - jedan urin nije dovoljan za citološku analizu
- PRIJE UZIMANJA URINA POTREBNO JE PROHODATI
 - da se odljušti čim više epitela (stanica) koji su bitni za analizu
- PRIJE UZIMANJA URINA POTREBNO JE OBAVITI HIGIJENU
 - spolovilo oprati sapunom te isprati čistom vodom da bi se izbjegla kontaminacija (onečišćenje) s kože
- UZIMA SE DRUGI JUTARNJI URIN NAKON IZMOKRENOG NOĆNOG URINA
 - stanice koje se skupljaju u urinu preko noći stajanjem se promijene, iz tog razloga se za citološku analizu ne uzima prvi jutarnji urin
- UZIMA SE SREDNJI MLAZ URINA
 - prvi mlaz izmokriti u WC, srednji mlaz u sterilnu posudu za urin, zadnji mlaz ponovno izmokriti u WC pri tome pazeći na čistoću poklopca posude
- URIN NE SMIJE DUGO STAJATI JER STAJANJEM STANICE PROPADAJU
 - potrebno ga je čim prije dostaviti u laboratorij
- VODITI BRIGU DA SE URIN NE UZIMA TIJEKOM MENSTRUALNOG CIKLUSA (MJESEČNICE) TE DVA DANA PRIJE I POSLIJE ISTE